

# SCORE Sd. DE ABSTINENCIA NEONATAL

NOMBRE:

Nº Hª:

FECHA :

PESO:

***SIGNOS / SNTOMAS SCORE M T N OBSERVACIONES***

Llanto excesivo.	2				
Llanto continuo	3				
Duerme < 1h dp comer	3				
Duerme < 2h dp comer	2				
Duerme <3h dp comer	1				
Moro hiperactivo	2				
Moro muy hiperactivo	3				
Temblor leve a la estimulación	1				
Temblor moderado/ severo a la estimulación	2				
Temblor leve espontáneo	3				
Temblor moderado/ severo espontáneo	4				
Hipertonía	2				
Excoriaciones (área)	1				
Sacudidas mioclónicas	3				
Convul. generalizadas	5				
Sudoración	1				
Fiebre <38´4°	1				
Fiebre > ó igual de 38,4°	2				
Piel marmorata	1				
Congestión nasal	1				
Estornudos > 3 ó 4 veces tiempo observación	1				
Aleteo nasal	2				
Bostezos frecuentes >3 ó 4 veces tiempo obs.	1				
FR >60 rpm	1				
FR> 50 rpm y retracción intercostal	2				
Succión excesiva.	1				
Mal apetito	2				
Regurgitación	2				
Vómitos proyectivos	3				
Heces blandas	2				
Heces líquidas	3				

**Determinaciones cada 4 horas (cada 2 h si puntuación en alza).**

**Iniciar tratamiento si Finnegan >8 ptos.**