

Valores normales en RN Pretérmino de pesos entre 500 y 750 gr.

Valores durante la primera semana de vida.

Fuente: Modificado de Spinazzola et al. J Perinatology 11(2): 149. 1991

DÍA	HT (% MEDIA)	SISTÓLICA (2DS)	MEDIA (2DS)	DIASTÓLICA (2DS)
0,5	48,4	44,4 (22,4)	33,3 (18,0)	27,7 (17,0)
1	44,8	46,7 (19,0)	33,6 (18,0)	30,2 (18,8)
2	40,7	46,3 (11,7)	35,0 (9,20)	29,4 (9,1)
3	41,2	49,5 (17,4)	37,6 (13,7)	31,6 (13,6)
4	41,7	49,6 (21,3)	37,1 (14,2)	30,8 (11,9)
5	45,7	49,6 (22,6)	37,1 (14,3)	30,8 (13,0)
6	42,8	50,6 (23,3)	37,5 (17,5)	31,0 (15,9)
7	41,7	51,6 (18,7)	38,6 (14,3)	32,2 (15,0)

Valores normales en RN Pretérmino de peso entre 750-1500 gr.

Método: Dinamap, niño despierto brazo derecho por la mañana.

Fuente: J Ped 112 (2) 268. Feb 1988

EDAD	SISTÓLICA (2DS)	MEDIA (2DS)	DIASTÓLICA (2DS)
1	67,9 (30,8)	57,7 (31,8)	43,5 (28,8)
2	71,9 (33,6)	59,6 (29,6)	48,3 (30,2)
3	74,3 (31,4)	63,7 (30,2)	49,3 (31,6)
4	77,5 (37,0)	65,0 (35,4)	52,5 (31,8)
5	74,2 (29,2)	61,9 (31,6)	49,0 (28,6)
6	76,8 (31,0)	63,5 (30,8)	51,8 (30,0)
7	76,2 (29,6)	63,5 (28,4)	47,6 (27,2)
10	72,8 (30,6)	59,2 (30,4)	46,7 (27,8)
14	75,7 (32,0)	58,1 (32,2)	45,8 (31,2)
21	76,2 (31,6)	60,2 (32,0)	48,8 (31,6)
28	78,0 (33,6)	65,0 (33,6)	48,7 (30,8)
35	78,1 (34,2)	63,4 (32,4)	50,4 (29,2)
42	80,3 (32,4)	63,0 (34,0)	50,4 (32,4)
49	85,2 (37,2)	60,2 (40,0)	53,3 (31,2)
56	86,0 (40,6)	69,4 (36,0)	51,9 (35,8)
63	83,9 (32,0)	66,3 (34,4)	51,8 (32,6)
70	90,8 (36,2)	70,9 (35,2)	55,3 (33,8)