

Valores normales en RN Pretérmino de pesos entre 500 y 750 gr.

Valores durante la primera semana de vida.

Fuente: Modificado de Spinazzola et al. J Perinatology 11(2): 149. 1991

| DÍA | HT (% MEDIA) | SISTÓLICA (2DS) | MEDIA (2DS) | DIASTÓLICA (2DS) |
|-----|--------------|-----------------|-------------|------------------|
| 0,5 | 48,4 | 44,4 (22,4) | 33,3 (18,0) | 27,7 (17,0) |
| 1 | 44,8 | 46,7 (19,0) | 33,6 (18,0) | 30,2 (18,8) |
| 2 | 40,7 | 46,3 (11,7) | 35,0 (9,20) | 29,4 (9,1) |
| 3 | 41,2 | 49,5 (17,4) | 37,6 (13,7) | 31,6 (13,6) |
| 4 | 41,7 | 49,6 (21,3) | 37,1 (14,2) | 30,8 (11,9) |
| 5 | 45,7 | 49,6 (22,6) | 37,1 (14,3) | 30,8 (13,0) |
| 6 | 42,8 | 50,6 (23,3) | 37,5 (17,5) | 31,0 (15,9) |
| 7 | 41,7 | 51,6 (18,7) | 38,6 (14,3) | 32,2 (15,0) |

Valores normales en RN Pretérmino de peso entre 750-1500 gr.

Método: Dinamap, niño despierto brazo derecho por la mañana.

Fuente: J Ped 112 (2) 268. Feb 1988

| EDAD | SISTÓLICA (2DS) | MEDIA (2DS) | DIASTÓLICA (2DS) |
|------|-----------------|-------------|------------------|
| 1 | 67,9 (30,8) | 57,7 (31,8) | 43,5 (28,8) |
| 2 | 71,9 (33,6) | 59,6 (29,6) | 48,3 (30,2) |
| 3 | 74,3 (31,4) | 63,7 (30,2) | 49,3 (31,6) |
| 4 | 77,5 (37,0) | 65,0 (35,4) | 52,5 (31,8) |
| 5 | 74,2 (29,2) | 61,9 (31,6) | 49,0 (28,6) |
| 6 | 76,8 (31,0) | 63,5 (30,8) | 51,8 (30,0) |
| 7 | 76,2 (29,6) | 63,5 (28,4) | 47,6 (27,2) |
| 10 | 72,8 (30,6) | 59,2 (30,4) | 46,7 (27,8) |
| 14 | 75,7 (32,0) | 58,1 (32,2) | 45,8 (31,2) |
| 21 | 76,2 (31,6) | 60,2 (32,0) | 48,8 (31,6) |
| 28 | 78,0 (33,6) | 65,0 (33,6) | 48,7 (30,8) |
| 35 | 78,1 (34,2) | 63,4 (32,4) | 50,4 (29,2) |
| 42 | 80,3 (32,4) | 63,0 (34,0) | 50,4 (32,4) |
| 49 | 85,2 (37,2) | 60,2 (40,0) | 53,3 (31,2) |
| 56 | 86,0 (40,6) | 69,4 (36,0) | 51,9 (35,8) |
| 63 | 83,9 (32,0) | 66,3 (34,4) | 51,8 (32,6) |
| 70 | 90,8 (36,2) | 70,9 (35,2) | 55,3 (33,8) |